

Лечение дефицита, вызванного мальабсорбцией или заболеванием печени, часто требует более высоких доз — до 1 мг (40000 единиц) в день. Более высокие дозы до 2,5 мг (100000 единиц) в день могут использоваться при лечении гипокальциемии, вызванной гипопаратиреозом.

Примечание. Пожилые люди нуждаются в этом витамине больше из-за возможности снижения способности кожи вырабатывать превитамин D3 или меньшего воздействия солнца, а также из-за снижения функции почек и неправильного усвоения витамина D.

Побочные эффекты:

Каждый препарат может вызывать нежелательные побочные эффекты наряду с желаемым терапевтическим эффектом. Хотя возникновение побочных эффектов наблюдается редко при правильном соблюдении назначенного количества витамина D и длительности лечения врачом, при возникновении любого из них следует проконсультироваться с врачом во время прекращения приема препарата.

Осложнения, при которых следует как можно скорее обратиться к врачу: Запор (особенно у детей и взрослых), диарея, сухость во рту, головная боль (постоянная), жажда, частое мочеиспускание, особенно ночью, потеря аппетита, металлический привкус, тошнота и рвота, необычное чувство слабости и усталости, боли в костях, мутная моча. Повышенная чувствительность глаз к свету и конъюнктивит, потеря веса, кожный зуд, сонливость, мышечные боли, снижение сексуальной активности, отложение кальция в аномальных тканях.

Отравление:

Симптомы отравления включают: повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, сильную боль в животе и высокую температуру. В случае случайного употребления большего количества, чем рекомендовано врачом, пациента следует доставить в больницу.

Обслуживание:

- Храните лекарство в недоступном для детей месте.
- Хранить при температуре ниже 30 градусов по Цельсию, в защищенном от света месте и беречь от замерзания.

Упаковка:

10 ампул витамина D3 по 300 000 МЕ/мл в коробке с листком-вкладышем.

REFERENCE: USP DJ 2009
Martindale pharmaceutical 2014

AN: OSVE - Vitamin D3 - 202

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو
به مسئول فروش، ۱۳۸۵-۱۵۵۲
و یا به استاکتورینت، info@osvahpharma.com ارسال فرمایید

OSVE

شرکت داروسازی اوسوه
www.osvahpharma.com

Осве – Витамин D3 Витамин D3 (300000 МЕ/мл)

Ампула

Осве – Витамин D3 (300000 МЕ/мл)
Раствор для инъекций 7,5мл/мл 1 мл

Витамин D очень необходим для роста костей и зубов. Недостаток или отсутствие этого витамина, особенно у детей, приводит к тому, что кости становятся мягкими, а кости зубов становятся слабыми. Этот витамин содержится в рыбьем жире и молоке. Это лекарство было назначено для лечения вашего текущего заболевания, поэтому не используйте его в подобных случаях и не рекомендуйте другим.

Основные инструкции:

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях:

- Если у вас в анамнезе аллергия на витамин D3 (соединения витамина D) или другие лекарства, продукты питания, консерванты, красители и т. д.
- При беременности (поскольку во время беременности очень важно правильно получать витамин D3, что осуществляется по назначению лечащего врача), соблюдении вегетарианской диеты (употребление растений), недостаточном употреблении молока в день, реже воздействие солнечного света и во время кормления грудью (особенно у матерей с темной кожей)
- В случае приема антацидов, содержащих магний и алюминий, препаратов, содержащих кальций, тиазидных диуретиков, приема других соединений витамина D, гликозидов наперстянки, противовоспалительных средств, гидантоина, барбитуратов, примидона, холестирамина, колестинола, минеральных масел, кортикостероидов,
- При заболеваниях сердца и сосудов, почек и саркоидозе, гиперфосфатемии, гиперкальциемии, атеросклерозе.

Потребление во время беременности и лактации:

- Никаких проблем с применением этого препарата во время беременности и грудного вскармливания не сообщалось, но лучше назначать его по мнению врача-специалиста.

Предупреждения:

- Это лекарство следует вводить только внутримышечно.
- Из-за риска хронического отравления витамином D не принимайте это лекарство в дозе, превышающей рекомендованную врачом.
- Избегайте приема безрецептурных препаратов или препаратов, содержащих кальций и фосфор, антацидов, содержащих магний и алюминий, во время приема этого лекарства.
 - Высокие дозы у детей могут привести к замедлению и задержанию роста, поэтому их следует назначать под наблюдением врача.

Количество и способ употребления:

Для предотвращения дефицита витамина D3 рекомендуемая суточная доза для детей и взрослых следующая: 400 единиц в день



OSVE - Vitamin D3 Brochure | 85 x 140 mm

OSVE Pharmaceutical Co.

Date: 95/5/27